

基準値一覧表

| 臨床化学 | | | 臨床化学 | | | 血液 | | |
|--------------|------------|--------|---------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 項目 | 基準範囲 | 単位 | 項目 | 基準範囲 | 単位 | 項目 | 基準範囲 | 単位 |
| TP | 6.6-8.1 | g/dL | GA | 11-16 | % | 白血球 | 3.3-8.6 | 10 ³ /μL |
| ALB | 4.1-5.1 | g/dL | 空腹時血糖 | 73-109 | mg/dL | 赤血球 男 | 4.35-5.55 | 10 ⁶ /μL |
| A/G | 1.32-2.23 | | HbA1c (NGSP値) | 4.9-6.0 | % | 赤血球 女 | 3.86-4.92 | 10 ⁶ /μL |
| 総ビリルビン | 0.4-1.5 | mg/dL | MMP3 男 | 36.9-121.0 | ng/mL | Hb 男 | 13.7-16.8 | g/dL |
| 直接ビリルビン | 0.0-0.4 | mg/dL | MMP3 女 | 17.3-59.7 | ng/mL | Hb 女 | 11.6-14.8 | g/dL |
| 間接ビリルビン | 0.1-0.8 | mg/dL | KL6 | 105.3-401.2 | U/mL | Hct 男 | 40.7-50.1 | % |
| 総コレステロール | 142-248 | mg/dL | トコトニト | 0.014以下 | μg/mL | Hct 女 | 35.1-44.4 | % |
| 中性脂肪 男 | 40-234 | mg/dL | アソニ | 70以下 | N-μg/dL | PLT | 158-348 | 10 ³ /μL |
| 中性脂肪 女 | 30-117 | mg/dL | 外ソ体 | 0-74 | μmol/L | 網赤血球 男 | 0.90-2.20 | % |
| LDLコレステロール | 65-163 | mg/dL | 乳酸 | 4.5-19.8 | mg/dL | 網赤血球 女 | 0.76-2.24 | % |
| HDLコレステロール 男 | 38-90 | mg/dL | 免疫血清 | | | <白血球分画> | | |
| HDLコレステロール 女 | 48-103 | mg/dL | 項目 | 基準範囲 | 単位 | 好中球 男 | 39.4-67.2 | % |
| AST (GOT) | 13-30 | U/L | CRP | 0.00-0.14 | mg/dL | 好中球 女 | 39.8-71.2 | % |
| ALT (GPT) 男 | 10-42 | U/L | NT-proBNP | 55以下 | pg/mL | 好酸球 男 | 0.9-6.0 | % |
| ALT (GPT) 女 | 7-23 | U/L | イソリ(前) | 18.70以下 | μU/mL | 好酸球 女 | 0.7-5.2 | % |
| LDH | 124-222 | U/L | CEA | 5.0以下 | ng/mL | 好塩基球 男 | 0.3-1.4 | % |
| LAP | 29-71 | U/L | AFP | 7.0以下 | ng/mL | 好塩基球 女 | 0.2-1.4 | % |
| ALP | 38-113 | U/L | PSA | 4.0以下 | ng/mL | 単球 男 | 4.8-10.1 | % |
| γ-GTP 男 | 240-486 | U/L | CA19-9 | 37以下 | U/mL | 単球 女 | 4.2-9.6 | % |
| γ-GTP 女 | 201-421 | U/L | CA125 | 35以下 | U/mL | リンパ球 男 | 24.1-48.6 | % |
| γ-GTP 男 | 13-64 | U/L | CA15-3 | 25.0以下 | U/mL | リンパ球 女 | 21.9-50.3 | % |
| γ-GTP 女 | 9-32 | U/L | ProGRP | 74.7以下 | pg/mL | 凝固線溶 | | |
| CK 男 | 59-248 | U/L | CYFRA | 2.8以下 | ng/mL | 項目 | 基準範囲 | 単位 |
| CK 女 | 41-153 | U/L | sIL2R | 122-496 | U/mL | APTT | 24.3-34.6 | 秒 |
| CK-MB | 10以下 | U/L | IgG | 861-1747 | mg/dL | PT | 70-130 | % |
| 総アミラーゼ | 44-132 | U/L | IgA | 93-393 | mg/dL | Fib | 200-400 | mg/dL |
| アミラーゼ | 16-52 | U/L | IgM 男 | 33-183 | mg/dL | AT-III | 80-130 | % |
| リパーゼ | 13-49 | U/L | IgM 女 | 50-269 | mg/dL | D-dimer | 0.0-1.0 | μg/mL |
| 尿酸 男 | 3.7-7.8 | mg/dL | C3 | 73-138 | mg/dL | FDP | 0.0-5.0 | μg/mL |
| 尿酸 女 | 2.6-5.5 | mg/dL | C4 | 11-31 | mg/dL | 尿定性 | | |
| 尿素窒素 | 8-20 | mg/dL | TSH | 0.500-5.000 | μIU/mL | 項目 | 基準範囲 | 単位 |
| クレアチン 男 | 0.65-1.07 | mg/dL | FT3 | 2.3-4.0 | pg/mL | pH | 5.0-8.0 | |
| クレアチン 女 | 0.46-0.79 | mg/dL | FT4 | 0.9-1.7 | ng/dL | 比重 | 1.005-1.030 | |
| トリウム | 138-145 | mmol/L | HCG | 5以下 | mIU/mL | 蛋白 | (-) | |
| カリウム | 3.6-4.8 | mmol/L | HBs抗原 | (-) | | 糖 | (-) | |
| カルシウム | 101-108 | mmol/L | HBs抗体 | (-) | | ウレリノゲン | NORMAL | |
| カリウム | 8.8-10.1 | mg/dL | HBc抗体 | (-) | | 潜血 | (-) | |
| マグネシウム | 1.6-2.6 | mg/dL | HCV抗体 | (-) | | その他 | | |
| 無機リン | 2.7-4.6 | mg/dL | HIV抗原抗体 | (-) | | 項目 | 基準範囲 | 単位 |
| 血清鉄 | 40-188 | μg/dL | TP抗体 | (-) | | 浸透圧(血清) | 265-300 | mOsm/Kg・H2O |
| TIBC 男 | 186-440 | μg/dL | プロカルシトニン | 0.046以下 | ng/mL | 浸透圧(尿) | 100-800 | mOsm/Kg・H2O |
| TIBC 女 | 197-495 | μg/dL | 尿化学 | | | 便 | | |
| UIBC 男 | 111-255 | μg/dL | 項目 | 基準範囲 | 単位 | 項目 | 基準範囲 | 単位 |
| UIBC 女 | 137-325 | μg/dL | クレアチニンクリアランス | 84以上 | ml/min | 便潜血 | (-) | |
| アミラーゼ 男 | 39.9-465.0 | ng/mL | uTP | 0-15 | mg/dL | 虫卵 | (-) | |
| アミラーゼ 女 | 6.2-138.0 | ng/mL | uALB | 0-30.0 | mg/g・Cr | *この基準範囲は、当院に限りの使用可能です。 公立学校共済組合 中国中央病院 臨床検査科 2024年7月1日 改訂 | | |
| ウレタン | 15.0以下 | IU/mL | uGLU | 0-30.0 | mg/dL | | | |